Инструкция за употреба

Degasin®

Simethicone 280 mg

MD Медицинско изделие

Медицинско изделие под формата на оранжева мека желатинова капсула с размери 8,3 mm x 13,2 mm ширина/дължина, което подобрява чревния и коремен комфорт при хора, страдащи от стомашно-чревни проблеми, свързани с образуване на газове: подуване, флатуленция и напрежение в корема.

Показания: Медицинското изделие е предназначено за употреба от възрастни за предотвратяване или облекчаване симптомите на стомашно-чревни проблеми, дължащи се на образуване на газове, като подуване на корема и флатуленция (изпускане на газове). Може да се използва и като подготовка преди диагностично изследване на коремната област (ендоскопия, рентгенография, ултразвуково изследване).

Предназначение: Това медицинско изделие е предназначено за употреба от възрастни за предотвратяване или облекчаване на стомашно-чревни проблеми, дължащи се на образуване на газове, като подуване на корема и флатуленция. Може да се използва и като подготовка преди диагностично изследване на коремната област (ендоскопия, рентгенография, ултразвуково изследване).

Потребители: Само за възрастни. Пациенти, страдащи от стомашно-чревни проблеми, свързани с образуване на газове: подуване на корема, флатуленция и коремно напрежение. Пациенти, преди диагностично изследване на коремната кухина (ендоскопия, рентгенография, ултразвуково изследване) по препоръка на лекар.

Противопоказания:
- в случай на известна свръхчувствителност към симетикон или към някоя от съставките
- в случай на известна или предполагаема перфорация или запушване на храносмилателния тракт
- при деца

Предпазни мерки: Едновременното приложение на левотироксин и симетикон може да доведе до намалена ефикасност на левотироксин и по този начин до намаляване на функцията на щитовидната жлеза. Това медицинско изделие може да се използва от хора с диабет, тъй като не съдържа захар. Тъй като симетиконът преминава и се екскретира непроменен през стомашно-чревния тракт, бременните и кърмещи жени биха могли да приемат продукта. Ако сте бременна или кърмеща жена, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди прием на продукта. Безопасността на употребата на симетикон по време на бременност не е била оценена.

Странични ефекти: Все още не са съобщени странични ефекти.

Предупреждения: Не използвайте това медицинско изделие след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „EXP". Срокът на годност се отнася до последния ден на посочения месец. Съдържа рибен желатин.

Не използвайте това медицинско изделие, ако е било изложено на температури извън посочените условия за съхранение или ако опаковката е повредена, и го изхвърлете в съответствие с местните изисквания.

Инструкции за употреба:

При стомашно-чревни проблеми: 1 мека капсула след всяко основно хранене през деня; приема се с голяма чаша вода. Не трябва да се приемат повече от 3 меки капсули за 24 часа. Капсулите са предназначени за перорален прием. Максималната продължителност на терапията не трябва да бъде повече от 30 последователни дни.

При подготовка за диагностично изследване: следвайте препоръките на Вашия лекар.

Само за възрастни. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Начин на действие: Симетиконът действа като намалява повърхностното напрежение на въздушните мехурчета, намиращи се в стомашно-чревния тракт и води до тяхното сливане (обединяване в по-големи формации). По този начин спомага за намаляване на газовете, за разпръскване на газовите джобове (мехурчета) и освобождаване на съдържащия се в тях газ. Симетиконът не се абсорбира, нито метаболизира от организма, елиминира се непроменен с фецеса. При приема мекатa капсулна обвивка се разпада и елиминира бързо в организма, като единствената й роля е да достави активната съставка симетикон в стомашно-чревния тракт.

Моля, докладвайте на производителя и компетентния орган (Изпълнителна агенция по лекарствата, ул.„Дамян Груев" № 8, 1303 София , Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg) за всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с употребата на това медицинско изделие.

Ако симптомите Ви не се подобряват или се влошават, препоръчително е да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Състав: симетикон 280 mg, мека капсулна обвивка: рибен желатин 90,678 mg, глицерол, пречистена вода, жълт железен оксид (E172, CI 77492), червен железен оксид (E172, CI 77491).

Съхранение: Съхранявайте при температура от 15°C до 25°C.

Резюме за безопасност и клинична ефективност (SSCP) е достъпно в EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) под номер Basic UDI DI: 8596024DEGASIN280MG2K.

Последна ревизия: 07/2026

Версия: 03

Walmark, a.s., Polní 836, 739 61 Třinec,
Република Чехия, www.walmarkgroup.stada

Стада България ЕООД, ул.Атанас Дуков 29,
ейнбоу плаза ет.5, София 1407, България, тел. 02/920 90 65
www.degasin.eu

CE 2265

LOT	Партиден номер		Използвай до дата
	Повторната употреба не е разрешена		Производител
	Да не се използва в случай, че опаковката е повредена		температурно ограничение (15-25°C)
CE	Европейско съответствие (European Conformity)	BIO	Съдържа биологичен материал от животински произход
	Не изхвърляйте продукта или опаковката му в околната среда.		Прочетете инструкциите за употреба
UDI	Уникален идентификатор на изделието		Дистрибутор
	Зелена точка		

W 30045/L/01/BGR

STADA