Návod k použití

Degasin®

Simetikon

MD *Zdravotnický prostředek* **280 mg**

Zdravotnický prostředek ve tvaru oranžové měkké želatinové tobolky o velikosti 8,3 mm x 13,2 mm šířka/délka, který přináší úlevu při střevních a břišních potížích u osob trpících gastrointestinálními problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a tlak v břiše.

Indikace: Tento zdravotnický prostředek je určen pro dospělé k prevenci a zmírnění příznaků gastrointestinálních potíží způsobených tvorbou plynu, jako je pocit nadýmání a plynatost. Tento zdravotnický prostředek je určen k přípravě pacienta před diagnostickým vyšetřením v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, ultrazvuk).

Účel použití: Zdravotnický prostředek je určen pro dospělé k prevenci nebo zmírnění gastrointestinálních potíží způsobených tvorbou plynu, jako je pocit nadýmání a plynatost. Může být také použit při přípravě na diagnostická vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, vyšetření ultrazvukem).

Uživatelé: Pacienti trpící gastrointestinálními problémy spojenými s tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a tlak v břiše. Pacient před diagnostickým vyšetřením břišní dutiny (endoskopie, radiografie, ultrazvuk) dle doporučení lékaře.

Cílová skupina pacientů: Tento zdravotnický prostředek je určen pouze pro dospělé.

Kontraindikace:
- v případě známé přecitlivělosti na simetikon nebo na kteroukoli složku přípravku,
- v případě známé perforace či obstrukce trávicího traktu anebo podezření na ni,
- u dětí.

Preventivní opatření: Současné podávání levothyroxinu a simetikonu může vést ke snížení účinnosti levothyroxinu, a tím ke snížení funkce štítné žlázy. Tento zdravotnický prostředek mohou používat osoby s diabetem, protože neobsahuje cukr. Protože se simetikon vylučuje v nezměněné formě trávicí soustavou, mohou jej užívat těhotné a kojící ženy. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem. Hodnocení bezpečnosti užívání simetikonu během těhotenství nebylo provedeno.

Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky dosud nebyly hlášeny.

Upozornění: Neužívejte tento zdravotnický prostředek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP". Datum exspirace se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Obsahuje rybí želatinu. Neužívejte tento zdravotnický prostředek, pokud byl vystaven teplotám překračujícím stanovené skladovací podmínky anebo pokud je obal poškozen, a zlikvidujte jej v souladu s místními požadavky.

Návod k použití: Úprava gastrointestinálních potíží: užívejte 1 měkkou tobolku po jídle, zapijte velkou sklenicí vody. Neužívejte více než 3 měkké tobolky za 24 hodin. Měkké tobolky se užívají perorálně. Maximální doba léčby je 30 po sobě jdoucích dnů. Příprava na diagnostická vyšetření: dodržujte doporučení svého lékaře. Pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze k jednorázovému použití.

Mechanismus účinku: Simetikon působí tak, že snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v zažívacím ústrojí a způsobuje jejich slučování, čímž pomáhá snižovat množství a napětí plynů jejich rozptýlením. Simetikon není organismem vstřebáván ani metabolizován; je vylučován beze změny stolicí. Měkká tobolka se rychle rozpadne a poté je vyloučena organismem, slouží pouze jako prostředek pro podání simetikonu.

Oznamte, prosím, jakoukoli závažnou událost, která se vyskytla v souvislosti s užíváním tohoto zdravotnického prostředku, výrobci a příslušnému orgánu (https://sukl.gov.cz/).

Pokud se vaše příznaky nezlepšují nebo se zhoršují, je vhodné se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Složení: simetikon 280 mg, měkká tobolka: rybí želatina 90,678 mg, glycerol, purifikovaná voda, žlutý oxid železitý (E172, CI 77492), červený oxid železitý (E172, CI 77491).

Skladování: Skladujte při teplotě 15 °C–25 °C.

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP) je k dispozici v EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) pod základním UDI DI: 8596024DEGASIN280MG2K.

Poslední revize: 7/2026

Číslo verze: 03

Walmark, a.s., Polní 836, 739 61 Třinec,
Česká republika, www.walmarkgroup.stada

STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/ 4,
155 00 Praha 5, Česká republika

www.degasin.cz

CE 2265

LOT	Kód šarže		Datum spotřeby
	Opakované použití není přípustné		Výrobce
	Nepoužívejte v případě poškození obalu		Teplotní omezení (15-25°C)
CE	Conformité Européenne (Evropská shoda)	BIO	Obsahuje biologický materiál živočišného původu
	Nevyhazujte výrobek ani jeho obal do životního prostředí.		Přečtěte si návod k použití
UDI	Jedinečný identifikátor zařízení		Distributor
	Green point/Zelený bod		

W 30625/L/02/CZE

STADA