Degasin®
szimetikon
MD *orvostechnikai eszköz* **280 mg**

Használati útmutató

Narancssárga színű, 8,3 mm x 13,2 mm szélességű, illetve hosszúságú lágyzselatin kapszula formájú orvostechnikai eszköz, mely javítja a bélrendszeri és hasi komfortérzetet azoknál a személyeknél, akiknél gázképződéssel összefüggő gyomor-bélrendszeri problémák jelentkeznek: puffadás, fokozott bélgázképződés (flatulencia) és hasi feszülés.

Javallatok:
Ez az orvostechnikai eszköz a gázképződés miatt kialakuló gyomor-bélrendszeri panaszok - mint a puffadás és a fokozott bélgázképződés - megelőzésére és a tünetek csökkentésére javallott felnőtteknél.
Ez az orvostechnikai eszköz a hasi terület diagnosztikus vizsgálatainak (endoszkópia, röntgen, ultrahang-vizsgálat) előkészítésében is alkalmazható.

Rendeltetés:
Ez az orvostechnikai eszköz felnőttek számára készült a gázképződés következtében kialakuló gyomor-bélrendszeri panaszok - mint a puffadás és a fokozott bélgázképződés - megelőzésére vagy enyhítésére. Használható továbbá a hasi terület diagnosztikus vizsgálatainak (endoszkópia, röntgen, ultrahang-vizsgálat) előkészítésében is.

Célfelhasználók:
Olyan betegek, akiknél gázképződéssel összefüggő gyomor-bélrendszeri problémák jelentkeznek: puffadás, fokozott bélgázképződés és hasi feszülés.
Orvosi javaslat alapján a hasüreg diagnosztikus vizsgálatai (endoszkópia, röntgen, ultrahang-vizsgálat) előtt álló betegek.

Célzott betegcsoport: Ezt az orvostechnikai eszközt kizárólag felnőttek használhatják.

Ellenjavallatok:
- szimetikonnal vagy bármely összetevővel szembeni ismert túlérzékenység esetén
- az emésztőrendszer ismert vagy feltételezett perforációja vagy obstrukciója esetén
- gyermekek esetén

Óvintézkedések:
Levotiroxin és szimetikon egyidejű alkalmazása a levotiroxin hatékonyságának csökkenéséhez vezethet, melynek eredményeképpen csökkenhet a pajzsmirigy működése.
Ezt az orvostechnikai eszközt cukorbetegek is alkalmazhatják, mert cukrot nem tartalmaz.
Mivel a szimetikon változatlan formában ürül az emésztőrendszeren keresztül, várandós és szoptató nők is alkalmazhatják a készítményt. Amennyiben Ön várandós vagy szoptat, kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy gyógyszerészétől, mielőtt elkezdi szedni ezt a terméket. A szimetikon terhesség alatti biztonságos alkalmazását nem értékelték.

Mellékhatások:
Mellékhatásokról ezideig nem számoltak be.

Figyelmeztetések:
Ne használja ezt az orvostechnikai eszközt a lejárati idő után, mely a faltkartonon és a blisztereken az "EXP" után került feltüntetésre. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.
Halzselatint tartalmaz.
Ne használja ezt az orvostechnikai eszközt, amennyiben az a megadott tárolási feltételeken kívül eső hőmérsékletnek volt kitéve, vagy ha a csomagolás sérült, a hulladékkezelésnél pedig a helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

Használati útmutató:
Gyomor-bélrendszeri problémák javítása: 1 lágy kapszula étkezés után egy nagy pohár vízzel. 24 órán belül legfeljebb 3 lágy kapszula vehető be. A lágy kapszulát szájon át kell bevenni.
A kezelés maximális időtartama 30 egymást követő nap.
Diagnosztikai vizsgálatok előkészítése: kövesse orvosa utasításait.
Kizárólag felnőtteknek. Gyermekektől elzárva tartandó. Csak egyszeri használatra.

Hatásmechanizmus:
A szimetikon a gyomor-béltraktusban kialakuló gázbuborékok felületi feszültségének csökkentésével hat, azok összeolvadását okozza, ezáltal elősegítve a gáz és a gáznyomás csökkenését diszperzióval. A szimetikon nem szívódik fel, és nem metabolizálódik a szervezetben; változatlan formában ürül a széklettel.
A lágy kapszula gyorsan szétesik, majd kiürül a szervezetből, kizárólag a szimetikon bejuttatására szolgál.

Kérjük, hogy az orvostechnikai eszköz alkalmazásával kapcsolatban bekövetkezett bármely súlyos eseményt jelentsen a gyártónak és az illetékes hatóságnak (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ).

Amennyiben tünetei nem javulnak vagy rosszabbodnak, javasolt orvoshoz vagy gyógyszerészhez fordulni.

Összetétel: 280 mg szimetikon, lágy kapszulahéj: 90,678 mg halzselatin, glicerin, tisztított víz, sárga vas-oxid (E172, CI 77492), vörös vas-oxid (E172, CI 77491).

Tárolás: 15°C – 25°C között tárolandó.

A biztonságosságra és a klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló (SSCP) megtalálható az EUDAMED-ben (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) az alábbi basic UDI-DI alatt: 8596024DEGASIN280MG2K

Utolsó felülvizsgálat: 7/2026

Verziószám: 03

Walmark, a.s., Polní 836, 739 61 Třinec,
Cseh Köztársaság, www.walmarkgroup.stada

Stada Hungary Kft., 1133 Budapest,
Váci út 116-118., Magyarország

www.degasin.eu

CE 2265

LOT	Tételkód		Lejárati dátum
	Tilos újrafelhasználni		Gyártó
	Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült		Hőmérsékleti korlát (15-25°C)
CE	Conformité Européenne (European Conformity)	BIO	Állati eredetű biológiai anyagot tartalmaz
	A terméket vagy a csomagolást ne juttassa a környezetbe		Tekintse át a használati utasítást
UDI	Egyedi eszközazonosító		Forgalmazó
	Zöld pont		